

Data 2024-10-04 07:49:42
 badania
 Numer 008051-24-MA
 próbki
 Uwagi: Kisz. z kukurydzy 2 Zakrzewo



Blattin Polska Sp. z o.o.
 ul. Poznowicka 1
 47-180 Siedlec

☎ 77 461 72 82

✉ www.blattin.pl

🌐 laboratorium@blattin.pl

Parametr	Wynik w SM	jedn.pom.
ADF	21,71	%
Amoniak	0,19	%
Białko	8,13	%
Cukier	1,82	%
kw.mlekowy	56,60	g/kg
Lignina	4,62	%
Lotne kw.org	39,85	g/kg
NDF	47,26	%
pH	4,37	
Popiół	7,44	%
Skrobia	31,74	%
Strawna masa org	72,78	%
Sucha masa (tol)	31,52	%
Surowe białko ADICP	0,64	%
Surowe białko NDICP	1,89	%
Tłuszcz	4,72	%

Dane wyliczone

Nazwa	jedn	w kg SM	w kg Br
EB	MJ/kg	18,32	5,77
EM	MJ/kg	10,45	3,29
NEL	MJ/kg	6,27	1,98
nBO	g/kg	126,80	39,97
BilNŻ	g/kg	-7,28	-2,29
białko og. strawne	g	47,15	14,86
tłuszcz strawny	g	37,29	11,75
BNW strawne	g	445,35	140,38
białko nier. w żwaczu	g	20,32	6,41
białko bez mocznika	g	81,30	25,63

Dane wyniki odnoszą się do przesłanej próby

PARAMETRY REFERENCYJNE							
Lp.	Parametr	Jednostka	Kiszonka z kukurydzy	Kiszonka z lucerny	Kiszonka z traw	Kiszonka motylkowych z trawami	Kiszonka ziarno kukurydzy
1.	Sucha masa	g/100g	33-38	Silos: 32-40 Baloty: 30-50	Silos: 30-40 Baloty: 35-55	Silos: 30-40 Baloty: 35-55	60-70
2.	Popiół surowy	g/100g	Poniżej 5	Poniżej 11	Poniżej 7	Poniżej 8	Poniżej 3
3.	Białko ogólne	g/100g	7-11	18-22	Powyżej 14	Powyżej 17	Poniżej 8
4.	NDF	g/100g	36-41	40-45	40-44	max. 41	10
5.	ADF	g/100g	16-22	31-35	29-31	max. 30	3,5
6.	Skrobia	g/100g	30-40	-	-	-	Powyżej 60
7.	Kwasowość paszy	pH	ok. 4,0	ok. 4,6	ok. 4,4	ok. 4,5	ok. 4,2

